

DOBOL® 50:25

Insetticida in emulsione concentrata (EC)

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO:
Reg. Ministero della Sanità n° 196975

COMPOSIZIONE

100 gr di prodotto contengono:

Acetamiprid tec	5 g (50 g/l)
d-Tetrametrina tec	2,5 g (25 g/l)
Piperonilbutossido tec	10 g (100 g/l)
Coformulanti e acqua q.b. a	100 g

CARATTERISTICHE

È un insetticida che esplica la sua azione per ingestione e contatto. Con l'associazione di tre principi attivi coniuga l'effetto abbattente (l'effetto biocida inizia nei primi minuti successivi all'applicazione) e la persistenza (azione del prodotto fino a 90 giorni) per una maggiore efficacia. L'appartenenza dei tre principi attivi a differenti famiglie chimiche minimizza i problemi di resistenza.

DESTINAZIONE D'USO

- Industria alimentare: ristoranti, alberghi, mense, locali di lavorazione e servizio di prodotti alimentari, mulini, mattatoi, caseifici, latterie, locali di stagionatura e conservazione di salumi e formaggi, magazzini e depositi di sostanze alimentari e silos vuoti.
- Enti e comunità: esercizi pubblici, ospedali, cliniche, case di riposo, scuole, caserme, uffici, cinema, teatri, biblioteche, comunità, locali pubblici in genere.
- Settore industriale: magazzini, locali destinati alla lavorazione ed allo stivaggio del tabacco purché vuoti, lavorazione lana, pelli, carta e tessuti in genere.
- Settore trasporti: metropolitane, automobili, autoambulanze, autobus, navi e carrozze ferroviarie Ambienti zootecnici: allevamenti, stalle, ricoveri di animali, canili, maneggi.
- Settore domestico: cucce fisse e da viaggio, abitazioni, condomini, cantine, ambienti frequentati da animali domestici in generale.
- Settore civile: viali, parchi e giardini, aree suburbane, campeggi, villaggi turistici, aree portuali e aeroportuali.
- Aree verdi: siepi, giardini, viali alberati, cespugli ornamentali e tappeti erbosi, per il controllo delle zanzare.

Non impiegare su animali o in prossimità di piante destinate all'alimentazione umana e/o animale.

DOSI D'IMPIEGO

Diluire 200 ml in 5 litri d'acqua (4%); la soluzione ottenuta è indicata per 100 m². Nei trattamenti su verde effettuare un'accurata bagnatura evitando il gocciolamento. Il prodotto rimane efficace fino a 90 giorni dopo il trattamento. In caso di necessità ed in ambienti polverosi/sporchi o soggetti a dilavamento applicare il prodotto con maggiore frequenza.



Indicazioni di Pericolo (H):

- H318: Provoca gravi lesioni oculari
- H351: Sospettato di provocare il cancro
- H361d: Sospettato di nuocere al feto
- H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 0 - Gennaio 2024



INFESTANTI TARGET

INSETTI STRISCIANTI

scarafaggi, formiche, acari della polvere, pulci, cimici dei letti, acari rossi dei polli, tenebrione

INSETTI VOLANTI

tarme, mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe, calabroni, vespa velutina

INSETTI DELLE DERRATE

tignole delle derrate alimentari

ATTREZZATURE CONSIGLiate

Spruzzatori a bassa pressione
Pompe elettriche